

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «Россельхозцентр»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№9 от 06 сентября 2022 г.

Адрес: г. Курск ул. Советская, д.55

e-mail: rsc46@mail.ru

Исх № 586 /01-08 от 06.09.2022г.

Подсолнечниковая огневка



Подсолнечниковая огневка вызывает потери 20-60% урожая подсолнечника. Вред обуславливается не только выеданием содержимого семян, но и оплетением корзинок паутиной и загрязнением их экскрементами гусениц; поврежденные корзинки часто загнивают. Бабочка подсолнечниковой огневки в размахе крыльев 20-27 мм, передние крылья светло-серые, удлиненные с четырьмя черными точками в средней части.

Яйцо длиной 0,8 мм, шириной 0,4 мм, молочно-белое, продолговатое, закругленное. Гусеница длиной 15-16 мм, светло-серая с тремя коричневыми полосами на спине. Куколка длиной 9-12 мм, коричневая, на кремастере 6-7 шипов, с булавовидным утолщением. Зимует гусеница последнего возраста (IV) в почве в продолговатом белом коконе.

Гусеницы I-II возрастов питаются цветками, более старших – выедают ядра семян. Поврежденные корзинки во время дождей загнивают.
ЭПВ подсолнечниковой огневки:

Культура	Фаза развития растения	ЭПВ
Подсолнечник	Налив семян - созревание	2-3 гусеницы на 1 корзинку

Специалистами отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области организованы постоянные наблюдения за вредителем и подаются сигнализационные сообщения о необходимости проведения профилактических мероприятий.

По вопросам проведения фитосанитарного мониторинга, консультаций в области защиты растений обращайтесь в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области.

По вопросам проведения обследований, обработок, консультаций в области защиты растений обращайтесь в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области по тел. (4712)54-96-04 или его районные подразделения.